

パスコード:082001 パス名称:経皮的冠動脈インターベーション(PCI/3泊4日) Ver1.0.4

入院日		検査前	検査後			
目標		治療に対する不安が軽減し、安心してPCIが受けられる	安心してPCIを受けられることができる	PCIに伴う合併症がなく経過でき、予定通り退院できる		
		1日前	検査前	検査後	1日後	2日後
検査	放射線		経皮的冠動脈インターベーション治療		X-P	
	検体検査				採血	
	生理検査				ECG	
投薬	持参薬続行 *当日のインスリン・血糖降下剤指示確認		AM検査：朝6時内服 PM検査：朝食後内服		糖尿病薬 朝食後から内服再開	
	アスピリン+プラビックスの内服確認		糖尿病薬：1日内服中止			
注射	点滴 (患者状態により指示あり)	点滴(8時30分) 午前カテ 200ml/h		流量指示どおり終了抜去		
		点滴(9時00分) 午後カテ 150ml/h		点滴朝までKeep		
		点滴(8時30分) 輸液少なめ				
		PCIセット				
異常時指示	異常時指示					
食事		AM検査 朝 禁食 昼 入院時食	PM検査 朝 1/2摂取可 昼 禁食 夕 入院時食	帰室後、飲水可 バンド解除後、食事可		
バイタル	1検	起床時・入室前	PCI後測定 (帰室後+ハーフカットまで1時間毎+臍前)	2検		
	観察項目		観察項目			
処置		動脈触知部マーキング	心電図モニター装着開始			
		膀胱留置カテーテル挿入	フットポンプ装着	膀胱留置カテーテル抜去		
		鼠径剃毛	バンド解除 (帰室後2時間)			
		造影剤は心カテ室の物を使用	ハーフカット (帰室後6時間)	ハーフカット (帰室後8時間)		
看護	院内フリー	心カテ室へ車椅子にて入室	帰室後トイレ歩行可			
	シャワー浴可	心カテ室へストレッチャー入室	帰室後ベッド上安静			
	看護必要度 看護区分					
教育指導	栄養指導	入院時説明(医師)	心カテ室へ ・バスタオル ・メガネ 持参確認		退院後の生活指導	
	その他	入院時説明(看護師) ・T字帯 ・バスタオル 準備説明と確認				
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア				
	褥瘡管理	褥瘡管理				
	その他	アレルギー確認				
文書		内服薬自己管理決定基準			退院療養計画書	
		検査同意書 造影剤使用の同意書				
		入院診療計画書				
その他						