

パスコード:111038 パス名称:人工みぎ股関節置換術

		術前		術後から術後1週間まで							
目標		#1 不安な気持ちを表出でき心理的安楽が得られる		#1 創傷痛がない							
		#2 検査、手術を安全実態に受けられる		#2 WBC、CRPが正常値以内で発熱がない							
				#3 術後出血の早期対応が受けられる							
				#4 静脈血栓がこない							
		2日前	1日前	術前	術後	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後
検査	放射線	X-P		X-P(術中)							
	検体検査	採血・尿検査				採血	採血		採血		
投薬		持参薬確認	OPE当日内服薬確認(麻酔科Dr指示)	術6時内服(麻酔科Dr指示)			内服薬(ドレーン除去後、夕からパファリン開始)		内服薬(セファクロル開始)		退院処方
											内服薬(定服処方)
注射				OPE室持参抗生剤	術室後点滴	持続点滴あり	点滴(持続)		点滴(持続)	点滴終了	
輸血		T & S									
手術				右THA手術オーダー							
異常時指示		異常時指示									
食事			術前補液の代わりに補水	絶食		飲水可(回診後より): 昼食よりE食開始(流動食)	朝より常食				
バイタル		2検			全身麻酔後(術室時・15分後・30分後・1時間後)測定	4検					2検
		観察項目			観察項目			観察項目		観察項目	
処置			術前後便処置(洗腸)		腸薬吸入8回(翌朝8時半まで)		腸薬吸入(21時からカヌラ2回(翌朝まで))		抜管	抜管後創退出液確認	
			剃毛		ドレーン管理				膀胱留置カテーテル抜き(歩行状態確認)		
			弾性ストッキング装着・脱衣		ターリダマンシーン(起床日まで)				クーリング		
					フットポンプ装着(日中は患部屈運動:21時より装着、起床後は不要)						
					ベッドサイドモニター使用(1術日から3術日まで手触モニター使用)						
						創傷蓋・包交					
						腸薬カヌラ2回(翌朝まで)					
看護			シャワー浴		膀胱留置カテーテル挿入中	全身清拭(シャワー浴まで)	ドレーン抜き/EPD抜き			シャワー浴確認	リハビリ(片脚起立、後歩開始)
						ベッドアップフリー	足関節の屈伸運動を促す	初期歩行(リハビリ介入、モニター装着、安静時・端坐位・立位・終了時バイタル測定) 病棟内フリー(歩行器歩行開始)		リハビリ(リハビリ開始、1本杖歩行開始)	
チーム医療	リハビリ	リハビリ受診				(ベッドサイドリハ開始)					
	退院支援										
教育指導	療養指導	療養指導									
	その他	入院説明 術前指導									
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア		転倒・転落アセスメントスコア					転倒・転落アセスメントスコア		
	褥瘡管理	褥瘡管理		褥瘡管理					褥瘡管理		
	その他	アレルギー確認									
文書		手術説明同意書 輸血同意書									
		入院診療計画書									
		下肢静脈造影検査同意 説明書									
		リハビリ実施計画書									
その他		必要物品預かり・フェイスタオル4枚、1手帳、バット	病室へ部屋移動						大部屋へ部屋移動		

[illegible]