

パスコード:140013 パス名称:水頭症手術(H29.7.7)

目標		術前 不安が軽減され、手術に臨むことができる 術前検査が完了している 意識・神経症状の変化が速やかに察知される							手術 トラブルなく手術が終了する 術後の安静が保たれる 創痛が軽減される			術後 早期に離床できる SSIや他の全身性合併症を起こさない 低髄圧症状が出現しない		
		5日前		4日前	3日前	2日前	1日前	当日			1日後		2日後	
		術前		術中		術後		1日後		2日後				
検査	放射線	レントゲン・CT(外来で実施済)										頭・胸・腹部レントゲン、頭部CT		
	検体検査	血液・尿検査(外来で実施済)										血液検査		
	生理検査	心電図(外来で実施済)												
投薬		常用薬内服継続										昼より内服再開		
注射						点滴オーダー確認			術中抗生剤(CEZ1.0g)	術後点滴(80mL/h)	点滴続行(60mL/h)	点滴続行(60mL/h)	点滴続行(60mL/h)	
処置	 弾性ストッキング装着													
							術前処置(入浴、洗髪)	術前処置(マーキング、弾性ストッキング)		酸素吸入				
										フットポンプ				
											包交(頭部、頸部、腹部)			
手術			次週予定手術オーダー確認(締切り)						V-Pシヤント					
輸血														
リハ依頼														
服薬指導依頼		薬剤使用開始時に依頼												
栄養指導依頼														
移動・食事	安静度	フリー(普段と同じ)									ベッド上安静	歩行可	フリー	
	栄養	食事(普段の食糧)						絶飲食				昼より食事再開		
	清潔	シャワー・入浴可					術前補水 夕食後～翌6時までに1000ccを目標に飲水							
	排泄	トイレへ(普段の排泄方法)								バルンカテーテル留置		清拭		
看護情報	検温	1検									1時間×4、以後4時間チェック		1検	
											心電図モニター			
											SpO2モニター			
											自動血圧計			
	意識・神経症状	意識レベル(GCS)											3検	
		頭痛												
		嘔気・嘔吐												
		めまい												
		構音障害												
		運動麻痺												
												創痛		
												創出血		
										腹部膨満				
バイタル														
カルテ														
確認	医師確認事項	入院診療計画書					手術同意書				手術結果の説明	検査結果説明		
	看護確認事項	入院オリエンテーション					手術同意書				安静度の説明			
		必要物品の説明					禁食札				ナースコール指導			
		アレルギーの有無								不穏時、身体抑制同意書				
										不穏時、家族への電話の可能性				
文書紹介														

[illegible]