結腸切除術（狭窄なし）

		術前			術後		術後2日目			術後5日目以降					
目標		#1 術前の処置が理解でき、予定通り実行できる			#1 バイタルサインが安定し、手術侵襲から早期に回復できる。		#1 術後合併症を起こさない。			#1 術後合併症なく退院を迎えることができる					
		#2 手術の必要性について理解できる。			#2 ドレーンより出血がなく経過できる。		#2 離床を進めることができる			#2 退院後の生活について理解できる					
		#3 不安について言葉にすることができる。			#3 創痛・苦痛がない(早期に軽減する)										
		2日前	1日前	当日 術前	当日 術後	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後
検査	放射線				術中X-P	胸腹X-P		胸腹X-P				胸腹X-P			
	検体検査					採血		採血				採血			
投薬		眠前アローゼン1包内服					疼痛時ﾛﾌﾟ内服								
			希望時眠剤内服												
注射				術前輸液	術後輸液	術後1日目輸液	術後2日目輸液	術後3日目輸液	術後4日目輸液						
輸血															
異常時指示					異常時指示										
食事		食事（常食）	朝 注腸造影食 昼より禁食、夕よりアクアサポート飲水開始	術前3時間前までアクアサポート飲水可 以降、絶飲食	絶飲食	回診後、飲水可	昼から流動食	昼から3分粥	昼より5分粥	昼から全粥	昼から常食	常食			
バイタル		観察項目			観察項目										
					バイタルサイン 術当日は、帰室後1時間までは15分毎 その後、1時間は30分毎測定 その後、1時間経過時測定 その後、2時間後測定	4検	3検			2検					
処置			臍処置(術前日までに)	弾性ストッキング装着	酸素吸入		SPO2測定								
			モビプレップ2000mlを1000ml内服		SPO2測定				硬膜外抜去			全抜鈎			
					心電図モニター				硬膜外抜去後 膀胱留置カテーテル抜去						
					フットポンプ装着										
					硬膜外持続注入										
						ドレーン管理									
看護		シャワー浴可			ベッド上安静	回診後、離床可		院内フリー							
		院内フリー				全身清拭			膀胱留置カテーテル抜去後、自尿確認・残尿測定						
		入院時 持参薬確認	食待ち札説明			陰部洗浄			ドレーン抜去後シャワー浴可						
		入院時 身長 体重測定	術前チェックシート作成・確認												
チーム医療	退院支援		周術期口腔ケア外来受診			周術期口腔ケア外来受診						周術期口腔ケア外来受診			
教育指導	その他	結腸パンフレット説明								栄養指導		退院指導			
		術前説明(看護師)													
		入院時説明													
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア 転倒転落危険度Ⅱ看護計			転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア							
	褥瘡管理	褥瘡管理 褥瘡リスク看護計画立案・説明			褥瘡管理					褥瘡管理					
	その他	アレルギー確認													
		モニター監視同意書確認													
文書		入院診療計画書説明	全麻・硬膜外麻酔同意書確認												
			手術・輸血・血液製剤同意書確認												
その他															