

経皮的冠動脈インターベーション(PCI)

目標		入院日	検査前	検査後
		治療に対する不安が軽減し、安心してPCIが受けられる	安心してPCIを受けることができる	PCIに伴う合併症がなく経過でき、予定通り退院できる
		1日前	当日	
			検査前	検査後
検査	放射線		経皮的冠動脈インターベーション治療	X-P
	検体検査			採血
	生理検査			ECG
投薬	持参薬続行 *当日のインスリン・血糖 降下剤指示確認	AM検査：朝6時内服 PM検査：朝食後内服		糖尿病薬 朝食後から内服再開
	アスピリン+プラビックスの内服確認	糖尿病薬：1日内服中止		
注射	点滴 (患者状態により指示あり)	点滴(8時30分) 午前カテ 200ml/h	流量指示どおり 終了抜去	
		点滴(9時00分) 午後カテ 150ml/h	点滴朝までKeep	
		点滴(8時30分) 輸液少なめ		
		PCIセット		
異常時指示	異常時指示			
食事		AM検査 朝 禁食 昼 入院時食	帰宅後、放水可 バンド解除後、食事可	
		PM検査 朝 1/2摂取可 昼 禁食 夕 入院時食		
バイタル	1検	起床時・入室前	PCI後測定 (帰宅後+ハーフカットまで1時間毎+眠前)	2検
	観察項目		観察項目	
処置	心電図モニター装着開始			
	SPO2測定			
		動脈触知部マーキング	フットポンプ装着	膀胱留置カテーテル抜去
		膀胱留置カテーテル挿入	バンド解除 (帰宅後2時間)	
		鼠径剃毛	ハーフカット (帰宅後6時間)	
	造影剤は心カテ室の物を使用	ハーフカット (帰宅後8時間)		
看護	院内フリー	心カテ室へ車椅子にて入室	帰宅後トイレ歩行可	
	シャワー浴可	心カテ室へストレッチャー入室	帰宅後ベッド上安静	
	看護必要度 看護区分			
教育指導	栄養指導			
	その他	入院時説明(医師)	心カテ室へ ・バスタオル ・メジャー 持参確認	退院後の生活指導
		入院時説明(看護師) ・T字帯 ・バスタオル 準備説明と確認		
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア		
	褥瘡管理	褥瘡管理		
	その他	アレルギー確認		
文書		内服薬自己管理決定基準		退院療養計画書
		検査同意書 造影剤使用の同意書		
		入院診療計画書		
その他				