

ペースメーカー造設

	入院日から手術前まで		手術後 合併症を起こすことなく、経過できる。									
目標			合併症を起こすことなく、経過できる。									
	1日前		当日		1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
検査	放射線			胸部レントゲンポータブル	胸部レントゲン							
	検体検査				採血							
	生理検査			心電図ポータブル	心電図							
投薬	術当日の内服確認(インスリン、血糖降下剤は術当日朝、昼中止。抗血小板剤、ワーフarinは主治医確認。)		AM手術:朝6時内服 PM手術:朝食後内服		抗生素内服							
					点滴(ロック)							
注射			抗生素投与									
					点滴(ロック)							
異常時指示												
処置	心電図モニター装着											
	弾性ストッキング装着		フットポンフ装着									抜鉗
	術着へ更衣 胸帶持参			包交								
	バルーン挿入(ope室にて) 造影剤は手術室の物を使用			バルーン抜去								
手術												
	服薬指導依頼											
移動・食事	 朝 禁食 昼 入院時食		AM手術 朝 禁食 昼 入院時食	術後1時間から飲水可								
	 朝 1/2摂取可 昼 禁食 タ 入院時食		PM手術 朝 1/2摂取可 昼 禁食 タ 入院時食									
安静度	病棟内フリー		室内フリー					病棟内フリー				院内フリー
				術側腕掌上不可								
看護情報												
	バイタル		出棟前	帰室後1時間置き(帰室3時間後まで+消灯時)								
観察項目	胸部症状 めまい 吐き気 肺雜 四肢冷感											
				創部痛 創部出血								
確認	カルテ											
	医師確認事項										退院処方 予約券の発行	
	看護確認事項		翌日朝・昼食事止め確認 アレルギーの有無確認 同意書確認 注射オーダー確認	水分摂取確認 ペースメーカー設定確認							看護サマリー記載	
	事務確認事項											
他科紹介		MSWへ身障書類依頼										
文書		入院治療計画書(リニカルバス)									身体障害者手帳認定書確認	
紹介											退院時療養計画書	