

# 経皮的冠動脈インターベンション(PCI)

入院日		検査前	検査後
目標		安心してPCIを受けることができる	PCIに伴う合併症がなく経過でき、予定通り退院できる
1日前		当日	
		検査前	検査後
1日後		2日後	
検査	放射線	経皮的冠動脈インターベンション治療	X-P
	検体検査		採血
	生理検査		ECG
投薬	持参薬続行 ★当日のインスリン・血糖降下剤指示確認	AM検査：朝6時内服 PM検査：朝食後内服	糖尿病薬 朝食後から内服再開
	アスピリン+プラビックスの内服確認	糖尿病薬：1日内服中止	
注射	点滴 (患者状態により指示あり)	点滴(8時30分) 午前カテ 200ml/h	流量指示どおり 終了抜去
		点滴(9時00分) 午後カテ 150ml/h	点滴朝までKeep
		点滴(8時30分) 輸液少なめ	
		PCIセット	
異常時指示	異常時指示		
食事		AM検査 朝 禁食 昼 入院時食	帰室後、飲水可 バンド解除後、食事可
		PM検査 朝 1/2摂取可 昼 禁食 夕 入院時食	
バイタル	1検	起床時・入室前	PCI後測定 (帰室後+ハーフカットまで1時間毎+睡前)
	観察項目		観察項目
処置	心電図モニター装着開始		
	SPO2測定		
	動脈触知部マーキング	フットボンブ装着	膀胱留置カテーテル抜去
	膀胱留置カテーテル挿入	バンド解除 (帰室後2時間)	
	鼠径剃毛	ハーフカット (帰室後6時間)	
	造影剤は心カテ室の物を使用	ハーフカット (帰室後8時間)	
看護	院内フリー	心カテ室へ車椅子にて入室	帰室後トイレ歩行可
	シャワー浴可	心カテ室へストレッチャー入室	帰室後ベッド上安静
	看護必要度 救護区分		
教育指導	栄養指導		
	その他	入院時説明(医師) 心カテ室へ ・バスタオル ・メガネ 持参確認	退院後の生活指導
	入院時説明(看護師) ・T字帯 ・バスタオル 準備説明と確認		
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア	
	褥瘡管理	褥瘡管理	
	その他	アレルギー確認	
文書	内服薬自己管理決定基準		退院療養計画書
	検査同意書 造影剤使用の同意書		
	入院診療計画書		
その他			