結腸切除術（狭窄あり）

		術前				術後		術後2日目			術後5日目以降					
目標						#1 バイタルサインが安定し、手術侵襲から早期に回復できる。		#1 術後合併症を起こさない。			#1 術後合併症を起こすことなく、退院を迎えることができる。					
						#2 ドレーンより出血がなく経過できる。		#2 離床を進めることができる			#2 退院後の生活について理解できる					
						#3 創痛・苦痛がない(早期に軽減する)										
		3日前	2日前	1日前	当日 術前	当日 術後	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後
検査	放射線					Xray 術中X-P	Xray 胸腹X-P		Xray 胸腹X-P				Xray 胸腹X-P			
	検体検査						採血		採血				採血			
投薬		眠前アローゼン1包内服 絶飲食時医師へ確認						疼痛時ﾛｷｿﾆﾝ内服								
				希望時眠剤内服												
注射					術前輸液	術後輸液	術後1日目輸液	術後2日目輸液	術後3日目輸液	術後4日目輸液						
輸血																
異常時指示						異常時指示										
食事		術前食は医師に確認	術前食は医師に確認	食事可能な場合は、朝より注腸造影食に変更。昼より禁食、経口補水可能であればアクアサポート飲水開始。 食止めの場合は、そのまま絶食。アクアサポート	経口補水可能であれば術前3時間前までアクアサポート飲水	絶飲食	回診後、飲水可	昼から流動食	昼から3分粥	昼より5分粥	昼から全粥	昼から常食	常食			
バイタル		観察項目				観察項目										
						バイタルサイン 術当日は、帰室後1時間までは15分毎 その後、1時間は30分毎測定 その後、1時間経過時測定	4検	3検			2検			2検		
処置		入院時身長体重測定		腸処置(術前日までに)	弾性ストッキング装着	酸素吸入		SPO2測定								
				必要時医師へ術前排便処置確認		SPO2測定				硬膜外カテーテル抜去後より膀胱留置カテーテル抜去。残尿測定			全抜鉤			
						心電図モニター				硬膜外抜去						
						フットポンプ装着										
						硬膜外持続注入										
							ドレーン管理									
看護		院内フリー				ベッド上安静　ﾍﾞｯﾄﾞｱｯﾌﾟ30度まで	回診後、離床可		院内フリー							
		シャワー浴可					全身清拭			ドレーン抜去後よりシャワー浴可						
		入院時　持参薬確認		食待ち札説明			陰部洗浄									
				術前チェックリスト作成確認												
チーム医療	退院支援			周術期口腔ケア外来受診			周術期口腔ケア外来受診						周術期口腔ケア外来受診			
教育指導	その他	入院時説明									栄養指導		退院指導			
		術前説明(看護師)														
		結腸パンフレット説明														
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア 転倒転落危険度Ⅱ看護				転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア							
	褥瘡管理	褥瘡管理入力 皮膚統合性リスク状態看護計画立案、説明				褥瘡管理					褥瘡管理					
	その他	アレルギー確認														
		入院診療計画書説明														
		モニター監視説明/同意														
文書				全麻・硬膜外麻酔同意書確認												
				輸血・血液製剤同意書確認												
その他																