

ソケイヘルニア

		術前	術後	術後1日目	術後2日目以降		
目標		#1術前の処置が予定通り実施できる。 #2手術の必要性が理解出来る。 #3不安を言葉にすることができる。	#1術後合併症を起こさない。	#1術後合併症を起こさない。	#1術後合併症を起こすことなく、退院を迎えることができる。		
		1日前	当日		1日後	2日後	3日後
検査	放射線	胸部レントゲン(外来にて施行)					
	検体検査	採血・採尿(外来にて施行)					
投薬			内服薬				
注射			術前輸液	術後輸液			
輸血							
異常時指示			異常時指示				
食事		夕食まで常食	朝8時まで飲水可。以後禁水食。	異常なければ帰室2時間以降は少量飲水可 夕食は常食。			
バイタル	観察項目	観察項目		観察項目	2検	1検	
				バイタル帰室時 帰室後から30分・1時間・2時間後			
処置			弾性ストッキング装着	心電図モニター 2時間後問題なければOFF	膀胱留置カテーテル抜去		
				フットポンプ装着 2時間後OFF			
看護		安静度フリー		術後2時間臥床安静 その後ベッドアップフリー	安静度フリー		
		シャワー可能			全身清拭	シャワー浴可	
		食待ち札説明					
		術前チェックシート作成・確認					
		術当日内服薬確認・準備 当日朝分の内服薬引き下げ					
チーム医療	退院支援						
教育指導	その他	術前説明(看護師)					退院指導
医療安全	転倒転落	転倒・転落アセスメントスコア 転倒転落危険度Ⅱ立案、説明		転倒・転落アセスメントスコア	転倒・転落アセスメントスコア		
	褥瘡管理	褥瘡管理 皮膚統合性リスク状態立案、説明		褥瘡管理			
	その他	アレルギー確認					
文書		手術・麻酔同意書説明					
		入院診療計画書説明					
その他							