脳内出血急性期治療Ver.5

ステップ名称		急性期														
		基準日	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後
		入院日														
目標		■脳内出血が増大しない														
		■全身状態が安定する														
		■神経症状が悪化しない														
		■早期にリハビリが開始される														
検査	放射線	頭部CT(外来で実施)	頭部CT						頭部CT							
		頭・胸レントゲン(外来で実施)														
		血液・尿検査(外来で実施)														
	検体検査								血液・尿検査							
	生理検査	心電図(外来で実施)														
投薬			内服可能ならば降圧剤等開始													
注射		点滴開始(80mL/h)	点滴開始(80mL/h)	点滴開始(80mL/h)												
		ニカルジピンciv	ニカルジピンciv	ニカルジピンciv												
		止血剤														
がん化学療法																
輸血																
手術		救命のため手術の可能性あり														
異常時指示																
食事		絶飲食														
バイタル		意識レベル(GCS)														
		呼吸障害														
		頭痛														
		嘔気・嘔吐														
		痙攣														
		めまい														
		瞳孔異常														
		眼球偏位														
		運動麻痺														
		感覚障害														
処置		ベッド上安静	ベッド上安静						シャワー浴可							
		下肢運動麻痺ある時、弾性ストッキング着用														
		4時間毎														
		2時間毎							車椅子可→適宜変更							
		4時間毎														
		酸素吸入(マスク・鼻カテ)														
		患者状態により指示(オムツ、尿器、導尿、バルン、トイレ)	ベッド上安静(ベッドアップ60度まで可)→適宜変更													
		絶飲食	絶飲食													
		必要時、バルンカテーテル留置	4時間毎→適宜変更													
		心電図モニター(オフ時に中止日入力)														
		SpO2モニター(オフ時に中止日入力)														
		自動血圧計(オフ時に中止日入力)														
		病状説明														
		血圧コントロール（緩め）														
			患者状態により食事オーダー　絶飲食→適宜変更													
看護		入院時オリエンテーション ・必要物品の説明　・抑制の説明・アレルギーの有無	MSWに介入依頼（依頼日に移動して適用）													
			清潔・整容													
			排泄													
チーム医療	リハビリ	リハビリ依頼(依頼可能日に適用)														
	ＮＳＴ															
	退院支援															
教育指導	栄養指導															
	服薬指導	服薬指導														
		薬剤使用開始時に依頼														
	その他															
医療安全	転倒転落															
	褥瘡管理															
	その他															
文書		入院診療計画書														
		脳卒中地域医療連携パス診療計画書														
		行動制限同意書														
その他																