ジェネレーター交換

		入院日から手術前まで		手術後								
目標				合併症を起こすことなく、経過できる。								
		1日前	当日		1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
			術前	術後								
検査	放射線			胸部レントゲンポータブル	胸部レントゲン							
	検体検査				採血							
	生理検査			心電図ポータブル	心電図							
				ペースメーカーチェック								
投薬		術当日の内服確認（インスリン、血糖降下剤は術当日朝、昼中止。抗血小板剤、ﾜｰﾌｧﾘﾝは主治医確認。	AM手術：朝6時内服 PM手術：朝食後内服			抗生剤内服						
注射			抗生剤投与		点滴（ロック）							
異常時指示		異常時指示										
処置		心電図モニター装着										
		SPO2測定										
			弾性ストッキング装着	ﾌｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ装着							抜鉤	
			術着へ更衣 胸帯持参		包交							
			ﾊﾞﾙﾝ挿入（ope室にて）		ﾊﾞﾙﾝ抜去							
手術												
服薬指導依頼												
移動・食事			AM手術 朝　禁食 昼　入院時食	術後1時間から飲水可								
			PM手術 朝　1/2摂取可 昼　禁食 夕　入院時食									
安静度		病棟内ﾌﾘｰ	室内ﾌﾘｰ					病棟内ﾌﾘｰ				院内ﾌﾘｰ
				術側腕挙上不可								
看護情報												
バイタル			出棟前	帰室後1時間置き（帰室3時間後まで＋消灯時）								
観察項目		胸部症状 めまい 吐き気 肺雑 四肢冷感										
				創部痛 創部出血								
カルテ												
確認	医師確認事項										退院処方 予約券の発行	
	看護確認事項	翌日朝・昼食事止め確認		水分摂取確認 ペースメーカー設定確認							看護サマリー記載	
		ｱﾚﾙｷﾞｰの有無確認 同意書確認 注射オーダー確認										
	事務確認事項											
他科紹介												
文書		入院治療計画書（ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ）									退院時療養計画書	
紹介												